

【低用量ピル 製品一覧】 2008年5月11日作成。 ★[低用量ピル普及推進委員会]管理人個人によるデータ収集で作成しております。記載事項に間違い等ございましたらご指摘をお願いいたします。

	3 相 性						1 相 性	
製品名	シンフェーズT28	ノリニールT28	オーソ777	トリキュラー21・28	アンジュ21・28	トライデール21・28	オーソM21錠	マーベロン21・28
製剤写真								
服用者向け 情報提供資料								
製造輸入発売元	日本モンサント	第一三共	ヤンセンファーマ	バイエル	あすか	日本ワイスレダリー	ヤンセンファーマ	シリング・ブラウ
販売元	ツムラ	科研	持田	バイエル	武田	武田	持田	第一三共
世 代	第1世代	第1世代	第1世代	第2世代	第2世代	第2世代	第1世代	第3世代
服用開始日	Sunday	Sunday	Day1	Day1	Day1	Day1	Day1	Day1
1期間： 21日間の配合パターン (一日量)								
活性錠の色調 (プラセボ錠の色調)	淡青→白→淡青 (橙) 	白→淡橙→橙 (黄) 	赤褐→白→淡黄褐 (白) 	赤褐→白→黄 (赤) 	橙 	白 (緑) 	白 (緑) 	
一周期あたりの投与量 プロゲステロゲン エストロゲン (総mg)	15NET 0.735EE	15.75NET 0.735EE	1.925LNG 0.680EE	21.0NET 0.735EE	3.15DSG 0.630EE			
パール指数※	0.59	0	0.38	0.28	0.19	0.087		
副作用 発生頻度 %(症例数)	34.0%(140/412) 悪心 6.3% 嘔吐 1.2% 頭痛 3.4% 乳房痛 1.0% 乳房緊満感 0.7% 腹痛 1.5%	42.0%(262/624) 悪心 21.3% 嘔吐 10.1% 頭痛 14.3% 乳房痛 12.3% 乳房緊満感 0.2% 下腹部痛 6.9%	50.9%(486/955) 悪心 29.4% 嘔吐 10.5% 頭痛 15.0% 乳房緊満感 19.0% 下腹部痛 6.5%	29.4%(203/690) 悪心 14.3% 嘔吐 5.4% 頭痛 7.8% 乳房痛 4.3% 乳房緊満感 0.6% 下腹部痛 0.4%	25.4%(132/519) 悪心 11.2% 嘔吐 4.6% 頭痛 7.7% 乳房痛 7.3% 乳房緊満感 0.4% 下腹部痛 4.6%	34.0%(252/952) 悪心 6.3% 嘔吐 1.2% 頭痛 3.4% 乳房痛 1.0% 乳房緊満感 0.7% 腹痛 1.5%		
不正出血	1周期 24.8% 3周期 12.8%	1周期 33.5% 3周期 24.4%	*1周期 14.5% 3周期 6.8%	#1周期 11.6% 3周期 4.9%	1周期 35.6% 3周期 19.7%	1周期 14.0% 6周期以降 5%前後		
消退出血の欠如率	1周期 11.5% 3周期 4.3%	1周期 5.5% 2周期以降平均3.5%	*1周期 1.18% 3周期 0.9%	#1周期 0.7% 3周期 0.4%	1周期 4.9% 3周期 5.0%	1周期 1.28% 3周期 1.85%		
試験参加の経口避妊薬 使用経験(%)	19.80%	29.20%	* 42.7%	# 21.6%	24.30%	46.90%		
第3相試験実施年	87.5~90.12	87.7~89.12	*87.2~90.3	#87.10~90.3	88.3~90.12	87.6~89.12		

NET: ノルエチステロン DSG: デソゲストレル  
LNG: レボノルゲステレル EE: エチニルエストラジオール

※パール指数: 100人の女性が1年間に避妊に失敗する確率

\*: トリキュラー21の臨床試験成績

#: アンジュ28の臨床試験成績

【参考文献】:「低用量ピル適正使用マニュアル」(株じほう)、  
OC情報センター(<http://pill-ocic.net>)、各製薬会社製品ページ

【注意】各写真は表の大きさに合わせています。実際のシートや錠粒、冊子の比率や色は、図のイメージと違う場合があります。